

СПИСАК ЛИЈЕКОВА  
ЗА КОЈЕ СЕ НЕ УГОВАРА РИЗИК ПРЕКОРАЧЕЊА ТРОШКОВА У 2024. ГОДИНИ

## ЦИТОСТАТИЦИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
L01CB01	етопозид	капсуле	50 mg	A1
L01XX05	хидроксикарбамид	капсуле	500 mg	A1
L02BA01	тамоксифен	таблете	10 mg	A
L02BB03	бикалутамид <sup>1</sup>	филм-таблете	50 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	1 – Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (C61) уз препоруку специјалисте онколога			
L02BG03	анастрозол <sup>2</sup>	филм-таблете	1 mg	A
L02BG06	ексеместан <sup>2</sup>	обложене таблете	25 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	2 – Лијечење хормонски зависног метастатског карцинома дојке (C50) након неуспјеха терапије са тамоксифеном или контраиндикације за тамоксифен код постменопаузалних жена уз препоруку специјалисте онколога			
L02BG04	летрозол	таблете	2,5 mg	A
L01BB02	меркаптопурин	таблете	50 mg	A1

## ОПИЈАТНИ АНАЛГЕТИЦИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
N02AA01	морфин <sup>1</sup>	сируп	10 mg/5 ml	A
		оралне капи	20 mg/ml	A
N02AA55	оксикодон, налуксон <sup>2</sup>	таблете са продуженим ослобађањем	2,5 mg + 5 mg	A
			5 mg + 10 mg	A
			10 mg + 20 mg	A
			20 mg + 40 mg	A
N02AB03	фентанил <sup>1</sup>	трансдермални фластер	50 mcg/h	A
			25 mcg/h	A
			100 mcg/h	A
N02AE01	бупренорфин <sup>1</sup>	трансдермални фластер	35 mcg/h; 52,5 mcg/h; 70 mcg/h	A
ИНДИКАЦИЈА	1- За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв.трећој аналгетичкој степеници (C00-C97) на препоруку специјалисте онколога. Након што су исцрпљене друге фармакотерапијске могућности у лијечењу бола, а на препоруку специјалисте неуролога или анестезиолога, у терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична неуралгија)(M79.2), постхерпетичке неуралгије (G53.0), тригеминалне неуралгије (G50.0), дијабетичке амиотрофије (G73.0), болних поремећаја			

	оптичког нерва (H47.0), каузалгије (G56.4), спондилодисцитиса (M50.1 и M51.1), дерматополиомиозитиса (M33.0) и посттрауматске неуралгије 2 – За лијечење умјерено јаког до јаког хроничног бола код болесника са малигним обољењем (C00-C97) на препоруку онколога.			
N02AX02	трамадол <sup>1</sup>	капсуле	50 mg	A
		филм-таблете	100 mg	A
		оралне капи, раствор	100 mg/ml	A
		таблете са модификованим ослобађањем	100 mg	A

## АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
N03AA02	фенобарбитон	таблете	100 mg	A
N03AD01	етосуксимид	сируп	50mg/ml(250mg/5ml)	A1
		капсуле	250 mg	A1
N03AE01	клоназепам	таблете	0,5 mg	A
			2 mg	
N03AF01	карбамазепин	таблете	200 mg	A
		таблете са продуженим ослобађањем	400 mg	A
		сируп	100 mg/5ml	A1
N03AF02	окскарбамазепин	орална суспензија	60 mg/ml	A
		филм-таблете	300 mg; 600 mg	
N03AG01	натријум- валпроат	таблете са продуженим ослобађањем	300 mg; 500 mg	A
N03AG01	валпроинска киселина	сируп	57,64 mg/1 ml	A
		оралне капи	300 mg/ml	A1
N03AX09	ламотригин	таблете	25 mg; 50 mg; 100 mg	A
		таблете за жвакање	5 mg	A
N03AG04	вигабатрин <sup>1</sup>	пулвис	500 mg	A1
N03AX03	султиам	филм - таблете	200 mg	A1
N03AX11	топирамат <sup>1</sup>	таблете	25 mg; 50 mg; 100 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	1 – За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или неуролога/неуропсихијатра.			

N03AX14	леветирацетам <sup>2</sup>	филм-таблете	250 mg; 500 mg; 1000 mg	A
		орални раствор	100 mg/1 ml	A
N03AX15	зонисамид	капусла	50 mg	A1
N03AX22	перампанел <sup>3</sup>	филм - таблета	12mg	A1
ИНДИКАЦИЈА	2 – Епилепсија (G40) 3 - За лица обољела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести.			
N03AX12	габапентин	капсуле	100 mg; 300 mg; 400 mg	Б

### АНТИПАРКИНСОНИЦИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
N04AA02	бипериден	таблете	2 mg	A
N04BA02	леводопа, бензеразид	таблете	(100+25) mg	A
		капсуле	(100+25) mg	A1
N04BC01	бромокриптин	таблете	2,5 mg	A
N04BC04	ропинирол <sup>1</sup>	филм- таблете	0,25 mg; 1 mg ;2 mg	A
		таблете са продуженим ослобађањем	2 mg; 4 mg; 8 mg	
N04BC05	прамипексол <sup>1</sup>	таблете	0,18 mg; 0,7 mg	A
		таблете са продуженим ослобађањем	0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg	
ИНДИКАЦИЈА	1 – Само за лијечење унапредовалог стадијума Паркинсонове болести (G20), по препоруци неуролога			

### ПСИХОЛЕПТИЦИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
N05AB02	флуфеназин	обложене таблете	2,5 mg; 5 mg	A
N05AD01	халоперидол	таблете	2 mg; 10 mg	A
N05AH02	клозапин	таблете	25 mg; 100 mg	A
N05AH03	оланзапин	филм-таблете, распадљиве таблете за уста	5 mg; 10 mg	A
N05BA01	диазепам <sup>1</sup>	таблете	10 mg	A
N05BA12	алпразолам	таблете	0,5 mg; 1 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	1 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20 – F29)			
N05BA01	диазепам <sup>2</sup>	микроклизма	5 mg/2,5 ml; 10	A1

			mg/2,5 ml	
ИНДИКАЦИЈА	2 – По препоруци педијатра или неуролога			
N05AA01	хлоропромазин	таблете	25 mg	A
N05BA09	клобазам <sup>3</sup>	таблете	10 mg; 20 mg	A1
ИНДИКАЦИЈА	3 – Као помоћна терапија у лијечењу епилепсије (G40), по препоруци педијатра или неуролога			
N05AX08	рисперидон <sup>1</sup>	филм-таблете	1 mg; 2 mg; 3 mg;	Б
N05AX12	арипипразол	орално дисперзибилна таблета	10 mg	Б
N05CF02	золпидем	филм-таблете	5 mg; 10 mg	Б

### ИМУНОСУПРЕСИВИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
L04AA06	микофенолна киселина <sup>1</sup>	капсуле	250 mg	A
		гастрорезистентне таблете	180 mg; 360 mg	
L04AA10	сиролимус <sup>1</sup>	таблете	1 mg	A1
L04AA18	еверолимус	таблете	0,5 mg	A1
L04AD01	циклоспорин <sup>1</sup>	капсуле	25 mg; 50 mg; 100 mg	A
		орални раствор	100 mg/ml, 50 ml	
L04AD02	такролимус <sup>1</sup>	капсуле	0,5 mg; 1 mg; 5 mg	A
		тврда капсула са продуженим ослобађањем	0,5 mg; 1 mg; 3 mg; 5 mg	
		таблета са продуженим ослобађањем	0,75 mg; 1 mg; 4 mg	
L04AX03	метотрексат	таблете	2,5 mg	A
ИНДИКАЦИЈЕ	1 – Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција (N18), трансплантација органа (Z94).			

## ХОРМОНИ ХИПОФИЗЕ И ХИПОТАЛАМУСА И АНАЛОЗИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
H01AC01	соматропин <sup>1</sup>	инјекција, прашак и растварач за раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом пџу	5 mg/1,5 ml; 10 mg/1,5 ml; 5,3 mg/ml; 12 mg/ml	A
H01AC08	соматрогон <sup>2</sup>	отопина за инјекцију у напуњеној брызгалици	24mg/1,2ml; 60mg/1,2ml	A
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>1 – Хипопитуитаризам (E23.0).                      - Турнеров синдром (Q96).                      - Као супституциона терапија код младих особа са урођеним или стеченим дефицитом хормона раста.                      2 - За лијечење дјече у доби од 3 до 18 година који имају поремећај у расту узрокован недовољним излучивањем хормона раста. Лијек се уводи у терапију по препоруци ендокринолога.</p>			

## НУТРИТИЈЕНТИ И ВЈЕШТАЧКИ ЗАСЛАЂИВАЧИ

АТС	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
V06CA01	дијететски препарат <sup>1</sup>	прашак		A
V06DX01	дијететски препарат <sup>4</sup>	прашак, течност		A
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>1 – Само за пацијенте обољеле од фенилкетонурије (E70).</p>			
V06DX	дијететски препарат – храна за посебне медицинске намјене <sup>2,3,4</sup>	прах, течност		A
ИНДИКАЦИЈЕ	<p>2 – Интолеранција протеина крављег млијека. Мултипла алергија на храну. Netherton-ов синдром (Q80.9). По препоруци педијатра.                      3 – Код алергије на протеине крављег млијека, по препоруци педијатра.                      4 - За лица обољела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести.</p>			